

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



### Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects copyrights-free medical documents for non-lucrative use.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to contact all the authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on: [facadm16@gmail.com](mailto:facadm16@gmail.com)

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.



# Embryologie de l'appareil génital

## I. Introduction

L'appareil génital est composé de :

- **Gonades**<sup>1</sup> : assurent la production des **spermatozoïdes** et **ovules** et la sécrétion des **hormones sexuelles**.
- **Voies génitales** : assurent le **transport** des **gamètes**<sup>2</sup> (+ rencontre des gamètes et gestation chez la femme.)
- **Glandes annexes aux voies génitales** : produisent des substances qui **soutiennent** les gamètes.
- **Organes génitaux externes**.

## II. Embryologie des gonades

- Il existe un dimorphisme sexuelle dont le gène déterminant est sur le **Y**. Ce gène, appelé **SRY**, code pour une protéine tel que :
  - **La présence de cette protéine** : est responsable du développement des gonades dans le **sens masculin**.
  - **Absence de cette protéine** : la gonade se développe dans le **sens féminin**.

**Remarque** : La détermination sexuelle (XX ; XY) est programmée **génétiquement** lors de la fécondation.

**Remarque** : Entre la 3<sup>ème</sup> et 6<sup>ème</sup> semaine : il n'y a aucune différence **morphologique** entre l'embryon *mâle* et *féfelle* (stade indifférencié).

- Testicule et ovaire : **dualité constitutionnelle** due à l'origine **différente** des **02 lignées** :
  - **Lignée germinale** : c'est la lignée reproductive = gonocytes.
  - **Lignée nourricière** : nourrit le reste des cellules

Les 02 lignées proviennent de dérivés **mésoblastiques** :

- **Mésenchyme** : gonocytes (lignée germinale)
- **L'épithélium cœlomique** : crêtes génitale (lignée nourricière)

### 1. Développement de la gonade indifférenciée

#### a. Apparition des gonocytes primordiaux 3<sup>ème</sup> sem

Les gonocytes (**a-2**) prennent naissance dans le **mésenchyme extra-embryonnaire** autour de la **vésicule allantoïde (8)**.

#### b. Apparition des crêtes génitales fin 4<sup>ème</sup>- 5<sup>ème</sup>

Les CG apparaissent sous forme d'une **crête longitudinale bilatérale**. Il y'a **prolifération** de l'**épithélium cœlomique** puis **condensation** du **mésenchyme** sous jacent entre le mésonéphros (**1+5+10..**) et la racine du mésentère dorsal (**9**).

#### c. Migration des gonocytes 5<sup>ème</sup> sem


Les gonocytes (**a- 2**) migrent le long du **mésentère dorsal (9)** vers les **crêtes génitales (7)** qu'elles envahissent à la fin de la 5<sup>ème</sup> (6<sup>ème</sup> sem) ; Les **CG** prolifèrent donnant naissance aux **cordons sexuels (6)** (tubes séminifères chez l'homme et cordons médullaire chez la femme).

**Remarque** : les CG sont dépourvues de gonocytes jusqu'à la 6<sup>ème</sup> semaine.

#### d. Formation de la gonade indifférenciée

1 Gonades = Testicule / Ovaire

2 Gamètes = Spermatozoïdes / Ovule



Faculté de médecine d'Alger  
2ème année 2016/2017

Module d'Histologie  
Embryologie de l'appareil génital

Safir Zakaria

Juste avant et durant l'arrivée des gonocytes l'épithélium coelomique prolifère et donne naissance au **cordons sexuels (CS)** qui entourent progressivement gonocytes.

Les **CS prolifèrent** en **profondeur** en restant connecté à l'épithélium; elles **s'anastomosent** en un **réseau** appelé **Rete**. Prolifération du **Rete** et apparition des 1ères connections urogénital (**Rete** se connecte au **tube néphrotique**).

**Remarque** : à ce stade la gonade présente le même aspect morphologique.

## 2. Les voies génitales indifférenciées

Jusqu'à la 7<sup>ème</sup> sem, les voies présente le même aspect comprenant :  
Les **canaux de Wolff (8)** et **canaux de Müller (6)** tout deux situés dans le **cordons urogénital (4)**.


- **Embryon mâle** : canaux de **Müller régressent**.
- **Embryon femelle** : canaux de **Wolff régressent**.

**Canaux de Müller** : invagination de l'épithélium coelomique

**Canaux de Wolff** (canaux mésonéphrotique) : voies excrétrices du mésonéphros

**Remarque** : Les 02 **cordons urogénitaux** se jettent sur le **sinus urogénital**

(2) Mésonéphros ; (3) Gonade.



## 3. Différenciation testiculaire de la gonade

Dès la 7<sup>ème</sup> sem, déclenché par la présence de la protéine issue du **gène SRY**. Cette protéine provoque des phénomènes :

### a. Formations des cordons testiculaires


Les **cordons sexuels** (une seule sorte de cellule - Épithélium des CG) + **gonocytes** = **cordons testiculaire**.

Les cordons testiculaires contiennent 02 sortes de cellules :

- **Gonocytes** ou **grandes cellules germinatives** : à l'origine des spermatogonies.
- **Cellules de Sertoli** = cellules nourricières

### b. Différenciation des cellules de Leydig

Dès la 8<sup>ème</sup> sem les cellules **mésenchymateuses** situés entre les cordons testiculaires se différencie en cellules **interstitielles de Leydig** source des **androgènes** qui seront responsable de la transformation du tractus génital mâle.



### c. Différenciation des VG mâle et mise en place des 1ères connections urogénital

Le **Rete** devenu **Rete testis (9)** fusionne avec la partie adjacente des **tubes mesonephrotique (5)** (partie moyenne du corps de Wolff)

- **Les canaux de Wolff** : sous l'effet de la **testostérone** sécrétée par les cellules de **Leydig**, donnent l'épididyme+ les canaux déférents + les vésicules séminales et canaux éjaculateurs. (image suivante)
- **Les canaux de Müller** : régressent sous l'effet de l'**hormone antimüllérienne** sécrétée par les cellules de Sertoli.

### d. Mise en place de l'albuginé

Sous l'épithélium coelomique se développe une **lame conjonctivo fibrillaire**: l'**albuginé (7 en vert)**


Elle **s'interpose** entre l'épithélium coelomique et le reste de la glande. Elle formera plus tard la **vaginale testiculaire**

De la face **profonde** (au contact de la gonade) partent des **cloisons** qui délimitent les **lobules testiculaires**.

Faculté de médecine d'Alger  
2ème année 2016/2017  
(3) Canal de Müller régressé  
(4) Canal déférent  
(5) Vésicule séminale  
(6) Canal éjaculateur  
(4+5+6) Canal de Wolff  
(10) Sinus urogénital

## Module d'Histologie Embryologie de l'appareil génital

Safir Zakaria




### 4. Différenciation ovarienne de la gonade

Dès la 8<sup>ème</sup> semaine. L'absence de la protéine issue du **gène SRY** provoque les phénomènes :

#### a. Régression

- **des cordons sexuels primaires** : qui, refoulés vers la partie centrale de l'ovaire constituent les **cordons médullaire**.
- **du rete ovari** : Il régresse avec une partie de ses connections avec les tubes mesonephrotique

**Remarque** : L'ensemble de ces structures primitives forment l'**organe de Rosenmüller** (époophore).



#### b. 2<sup>ème</sup> poussée de l'épithélium coelomique

A l'origine des cordons sexuels secondaires (cordons corticaux - de valentin prfluger - occupent le cortex ovarien) formé de 02 types cellulaires :


- **Gonocytes** ou **grande cellules germinatives** : à l'origine des ovogonies. Celles ci vont se multiplier activement et engendrer la totalité des gamètes femelles **avant** la naissance.
- **Petites cellules végétative** : à l'origine des cellules folliculaires.

Par la suite les **cordons corticaux s'isole** de la paroi coelomique, se **fragmentent** pour donner naissance aux **follicules primordiaux (2)** (200k à 400k). Chacun renferme un ovocyte de 1<sup>ère</sup> ordre.

#### c. Différenciation VG femelles

**Canaux de Wolff(4)** : régression (absence de testostérone).

**Canaux de Müller** : donnent les trompes(8), l'utérus(10), une partie du vagin (12).



#### d. Epithélium de revêtement de l'ovaire

Interposition du mésenchyme (7 – image ) qui sépare les cordons corticaux de l'épithélium coelomique